



A Hendrix Genetics Company



ISA BROWN



HISEX BROWN



BOVANS BROWN



ISA SUSSEX



BOVANS SPERWER



DEKALB WHITE



MORAVIA

MORAVIA BSL



MORAVIA BARRED



A Hendrix Genetics Company

INTEGRA, a.s.
Zemědělská 53
664 63 Žabčice
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 547 231 166
Fax: +420 547 231 092

www.integrazabčice.cz
info.integra@hendrix-genetics.com



Doporučení pro chov nosnic na dvorcích



A Hendrix Genetics Company

Váš dodavatel kuřic:

Vážení chovatelé nosnic, děkujeme, že jste si zakoupili kuřice právě od naší firmy.

Nakupujeme jednodenní kuřata z líhni INTEGRA, a.s. Žabčice, kde je záruka kvality a veterinárního dohledu.

Kuřice jsou vakcinovány v prvním dnu proti Markově chorobě a infekční bronchitidě.

Další vakcinace během odchovu, dle vakcinačního doporučeného programu.

1 Výběr barvy nosnic

Barva a vysoká hmotnost kuřice není zárukou kvality a dobré snášky, nicméně barvou odlišíte různé stáří nosnic. Když budete chovat jedno stáří, zamezíte přenosu chorob od starých nosnic. Ideální je nákup kuřic ve stáří 16 až 18 týdnů, kuřice jsou odchovány v dobrém prostředí a krmeny kvalitní směsí pro odchov.

2 Ustájení nosnic

Ustájení nosnic do čistého, vyběleného a vydezinfikovaného kurníku je samozřejmostí, jestli mají nosnice hlubokou podestýlku, tak na 1 m² ustájíme 7 - 8 ks nosnic. Krmítko - je třeba 10 cm krmné hrany na 1 nosnici, napáječky - cca 3 cm napájecí hrany na 1 kus. 1 snáškové hnízdo počítáme na 3 - 5 nosnic, vysteleme suchou slámou. Dále je nutné mít v kurníku hřady na nocování a hrabaniště s pískem (popel).

3 Krmení a napájení nosnic

Krmíme 2krát denně, když nemáme vhodnou směs na snášku, zkrmujeme např. pšenici 50 %, kukuřici 30 %, 20 % jiných obilovin (oves, ječmen) dále minerální látky (např. sušené drcené skořápky nebo vápenný grit) a doplňky vitamínů, makro a mikroprvků a aminokyselin, které koupíme v chovatelských potřebách nebo u veterinárního lékaře. Dále je vhodné zelené krmivo (tráva, vojtěška), mrkev, řepa, brambory, jako doplnění krmné dávky – nosnice budou mít pěkně oranžové žloutky. Vodu je třeba měnit denně, přístup nosnic k vodě je nutný stále.

4 Kontrola zdravotního stavu

Denně kontrolujeme zdravotní stav a chování nosnic, při výskytu cizopasníků (čmelíků) okamžitě vyčistíme kurník i hnízdo a ošetříme vhodným dezinfekčním prostředkem. Případné vyšší úhyny konzultujeme s veterinářem. Napáječky a krmítka udržujeme v čistotě, také hnízda a celý kurník.

5 Ideální teplota prostředí

Optimální teplota pro nosnice se pohybuje mezi 10 - 25 stupni, při nižších nebo vyšších teplotách klesá příjem krmiva a snáška.

6 Světelný den

Nepodceňujeme ani světelný den, světlo (sluneční nebo umělé) stimuluje produkci hormonů hypofýzy, což má přímý vliv na činnost vaječníků, tedy na produkci vajec. Kuřice v 16 týdnu stáří byly odchovány na cca 10 hod světla. Měli bychom každý týden přidat o 1 hod světla více, abychom se dostali ve 20 týdnu stáří na 14 až 16 hodin světla. Pak se nám nosnice začnou pěkně roznášet. V době podzimní, kdy se den zkracuje, bychom měli nosnicím přisvítit uměle. Při problémech, s kterými si nevíte rady, kontaktujte svého dodavatele kuřic.

***Přejeme vám zdravý
a úspěšný chov nosnic!***

